

**ENCUESTA SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL PACIENTE  
RENAL QUE INICIA DIÁLISIS PROVENIENTE DE TRASPLANTE O CON  
INICIO NO PROGRAMADO**

**RESULTADOS**

Se han recogido 104 cuestionarios de pacientes que han iniciado diálisis provenientes de trasplante o con inicio no programado en alguno de los 8 centros participantes en el estudio (Hosp. Clínico de Barcelona, Hosp. Central de Asturias, Hosp. Bellvitge de Barcelona, Hosp. Clínico San Carlos de Madrid, Hosp. Juan Canalejo de A Coruña, Hosp. La Paz de Madrid, Hosp. Universitario de Canarias y Hosp. Virgen del Rocío de Sevilla). De los 104 pacientes analizados, 56 (54.9%) eran pacientes con inicio no programado de diálisis crónica, mientras que 46 (45.1%) proveían de trasplante. Respecto a la modalidad de diálisis crónica seleccionada, tenemos 3 pacientes (2.9%) en los que no consta modalidad, 94 (90.4%) que inician en hemodiálisis (HD), 1 (1.0%) en hemodiálisis en domicilio (HD domicilio), 4 (3.8%) en diálisis peritoneal continua ambulatoria en domicilio (DPCA) y 2 (1.9%) en diálisis peritoneal automatizada nocturna en domicilio (DPAN).

*NOTA: En todas las tablas se ha añadido un campo con los casos en los que no consta cada característica, por si se decide imputar todos sus casos a alguna de las categorías recogidas (por ejemplo, esto no tiene sentido en el sexo, aunque puede tener sentido en la variable que recoge si el paciente ha sido o no ingresado, en la que tal vez pueda suponerse que los que no han contestado nada son no ingresados). Para aquellas características en las que el nivel de no consta no dependa de la procedencia del paciente esto no supone ningún problema, aunque en aquellas en las que los no consta sean mayoritarios en un grupo que en otro debería tenerse en cuenta para saber que los porcentajes que en la actualidad se muestran tienen en cuenta los no consta como una categoría a parte.*

La tabla I describe las principales variables demográficas recogidas, tanto para el total de pacientes incluidos en la muestra como para cada uno de los grupos de pacientes clasificados según su procedencia. En ella observamos una edad media de 54.9 años en los pacientes analizados, con una mayoría de hombres (53 de 100 = 53%), con 80 pacientes que necesitaron ingreso (de 90 en los que se recoge esta característica, es decir, un 88.9%) y que presentan una mediana de 18 días de ingreso.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
Edad			
N	104	56	46
Media (DT)	54,9 (15,82)	58,5 (17,38)	50,3 (12,15)
Mediana (máx - mín)	56 (20 - 86)	62 (20-86)	50 (27,72)
Sexo			
No consta	4 ( 3,8%)	1 ( 1,8%)	2 ( 4,3%)
Hombres	53 (51,0%)	30 (53,6%)	23 (50,0%)
Mujeres	47 (45,2%)	25 (44,6%)	21 (45,7%)
Ingresados			
No consta	14 (13,5%)	8 (14,3%)	5 (10,9%)
No	10 ( 9,6%)	1 ( 1,8%)	9 (19,6%)
Sí	80 (76,9%)	47 (83,9%)	32 (69,6%)
Días de ingreso			
N	80	47	32
Media (DT)	27,1 (29,4)	28,8 (32,3)	24,6 (25,5)
Mediana (máx - mín)	18 (1-150)	18 (1-150)	17 (1-120)

De 1 a 7 días	16 (20,0%)	10 (21,3%)	6 (18,8%)
De 8 a 14 días	15 (18,8%)	9 (19,1%)	6 (18,8%)
De 15 a 30 días	33 (41,3%)	16 (34,0%)	16 (50,0%)
De 31 a 90 días	13 (16,3%)	10 (21,3%)	3 ( 9,4%)
Más de 90 días	3 ( 3,8%)	2 ( 4,3%)	1 ( 3,1%)

*Tabla I: Principales características demográficas.*

En la tabla II podemos ver la distribución de modalidades de diálisis crónica seleccionada, tanto para el total de pacientes encuestados como para cada una de las procedencias consideradas.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	3 ( 2,9%)	3 ( 5,4%)	0 ( 0,0%)
HD	94 (90,4%)	50 (89,3%)	43 (93,5%)
HD domicilio	1 ( 1,0%)	0 ( 0,0%)	1 ( 2,2%)
DPCA	2 ( 1,9%)	1 ( 1,8%)	1 ( 2,2%)
DPAN	4 ( 3,8%)	2 ( 3,6%)	1 ( 2,2%)

*Tabla II. Modalidad de diálisis crónica seleccionada*

En la tabla III se observa el nivel de conocimiento de cada modalidad de diálisis, tanto en la población total como en cada una de los grupos considerado. Se observa que el porcentaje de pacientes que conocen la HD (bien o muy bien) es del 66.3% (69 de 104), que baja al 17.7% para la HD en domicilio (17 de 96 en los que se conoce su nivel de conocimiento), al 25.0% para la DPCA (25 de los 100 de los que se recoge su nivel de conocimiento) o al 23.3% para la DPAN (21 de 90 de los que consta nivel de conocimiento). Como vemos, el porcentaje de pacientes que conocen la HD es muy superior a la del resto de modalidades, tanto de forma global como para cada uno de los grupos considerados.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (54,9%)	46 (45,1%)
Conoce la Hemodiálisis (HD)			
No	3 ( 2,9%)	3 ( 5,4%)	0 ( 0,0%)
Poco	23 (22,1%)	19 (33,9%)	3 ( 6,5%)
Regular	9 ( 8,7%)	8 (14,3%)	1 ( 2,2%)
Bien	37 (35,6%)	19 (33,9%)	18 (39,1%)
Muy Bien	32 (30,8%)	7 (12,5%)	24 (52,2%)
Conoce la Hemodiálisis en domicilio (HD domicilio)			
No consta	8 ( 7,7%)	5 ( 8,9%)	3 ( 6,5%)
No	58 (55,8%)	35 (62,5%)	22 (47,8%)
Poco	17 (16,3%)	8 (14,3%)	8 (17,4%)
Regular	4 ( 3,8%)	2 ( 3,6%)	2 ( 4,3%)
Bien	10 ( 9,6%)	4 ( 7,1%)	6 (13,0%)
Muy Bien	7 ( 6,7%)	2 ( 3,6%)	5 (10,9%)
Conoce la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria en domicilio (DPCA)			
No consta	4 ( 3,8%)	4 ( 7,1%)	0 ( 0,0%)
No	41 (39,4%)	26 (46,4%)	14 (30,4%)
Poco	18 (17,3%)	5 ( 8,9%)	13 (28,3%)
Regular	16 (15,4%)	9 (16,1%)	7 (15,2%)
Bien	19 (18,3%)	9 (16,1%)	10 (21,7%)
Muy Bien	6 ( 5,8%)	3 ( 5,4%)	2 ( 4,3%)
Conoce la Diálisis Peritoneal Automatizada Nocturna en domicilio (DPAN)			

No consta	14 (13,5%)	8 (14,3%)	6 (10,7%)
No	42 (40,4%)	26 (46,4%)	15 (26,8%)
Poco	18 (17,3%)	7 (12,5%)	11 (19,6%)
Regular	9 ( 8,7%)	3 ( 5,4%)	6 (10,7%)
Bien	16 (15,4%)	10 (17,9%)	6 (10,7%)
Muy Bien	5 ( 4,8%)	2 ( 3,6%)	2 ( 3,6%)

*Tabla III. Conoce las diferentes técnicas de diálisis*

En la tabla IVa se observa que, de los 101 pacientes que conocen algo la HD, en la gran mayoría de los casos lo hacen a través del médico (83 de 99 = 83.8%), cosa que no ocurre así para el resto de modalidades (tablas IVb, IVc y IVd, donde la aportación de información de enfermería y de otros enfermos es muy significativa y disminuye la aportación de los médicos, especialmente en las dos modalidades de diálisis peritoneal.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
Conoce la HD			
No	3 ( 2,9%)	3 ( 5,4%)	0 ( 0,0%)
Poco / Reg / Bien / Muy bien	101 (97,1%)	53 (94,6%)	46 (100,0%)
Cómo la ha conocido			
No consta	2 ( 2,0%)	1 ( 1,9%)	1 ( 2,2%)
Médico	83 (82,2%)	42 (79,2%)	39 (84,8%)
Enfermería	45 (44,6%)	22 (41,5%)	22 (47,8%)
Familia	7 ( 6,9%)	5 ( 9,4%)	2 ( 4,3%)
Otro enfermo	11 (10,9%)	4 ( 7,5%)	7 (15,2%)
Internet	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)
Otro medio de comunicación	3 ( 3,0%)	3 ( 5,7%)	0 ( 0,0%)

*Tabla IVa. Fuente de información de la HD.*

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
Conoce la HD domicilio			
No consta	8 ( 7,7%)	5 ( 8,9%)	3 ( 6,5%)
No	58 (55,8%)	35 (62,5%)	22 (47,8%)
Poco / Reg / Bien / Muy bien	38 (36,5%)	16 (28,6%)	21 (45,7%)
Cómo la ha conocido			
No consta	4 (10,5%)	3 (18,8%)	1 ( 4,8%)
Médico	17 (44,7%)	8 (50,0%)	9 (42,9%)
Enfermería	10 (26,3%)	4 (25,0%)	5 (23,8%)
Familia	3 ( 7,9%)	1 ( 6,3%)	2 ( 9,5%)
Otro enfermo	6 (15,8%)	2 (12,5%)	4 (19,0%)
Internet	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)
Otro medio de comunicación	2 ( 5,3%)	1 ( 6,3%)	1 ( 4,8%)

*Tabla IVb. Fuente de información de la HD en domicilio.*

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
Conoce la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria en domicilio (DPCA)			
No consta	4 ( 3,8%)	4 ( 7,1%)	0 ( 0,0%)
No	41 (39,4%)	26 (46,4%)	14 (30,4%)

Poco / Reg / Bien / Muy bien	59 (56,7%)	26 (46,4%)	32 (69,6%)
No consta	1 ( 1,7%)	1 ( 3,8%)	0 ( 0,0%)
Médico	24 (40,7%)	13 (50,0%)	11 (34,4%)
Enfermería	24 (40,7%)	10 (38,5%)	13 (40,6%)
Familia	2 ( 3,4%)	2 ( 7,7%)	0 ( 0,0%)
Otro enfermo	22 (37,3%)	8 (30,8%)	14 (43,8%)
Internet	1 ( 1,7%)	1 ( 3,8%)	0 ( 0,0%)
Otro medio de comunicación	6 (10,2%)	1 ( 3,8%)	5 (15,6%)

*Tabla IVc. Fuente de información de la DPCA en domicilio.*

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
Conoce la Diálisis Peritoneal Automatizada Nocturna en domicilio (DPAN)			
No consta	14 (13,5%)	8 (14,3%)	6 (10,7%)
No	42 (40,4%)	26 (46,4%)	15 (26,8%)
Poco / Reg / Bien / Muy bien	48 (46,2%)	22 (39,3%)	25 (54,3%)
No consta	4 ( 8,3%)	3 (13,6%)	1 ( 4,0%)
Médico	17 (35,4%)	8 (36,4%)	8 (32,0%)
Enfermería	21 (43,8%)	9 (40,9%)	11 (44,0%)
Familia	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)
Otro enfermo	13 (27,1%)	6 (27,3%)	7 (28,0%)
Internet	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)
Otro medio de comunicación	7 (14,6%)	1 ( 4,5%)	6 (24,0%)

*Tabla IVd. Fuente de información de la DPAN en domicilio.*

En la tabla V se muestra el porcentaje de pacientes que ha recibido algún tipo de diálisis durante los días de ingreso en el hospital, así como la modalidad de diálisis utilizada para ello. Vemos que de los 80 pacientes en los que consta que han recibido algún tipo de diálisis, la mayoría lo hacen en HD, y sólo el 5% recibe alguna de las otras modalidades.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	5 ( 4,8%)	4 ( 7,1%)	1 ( 1,8%)
No	19 (18,3%)	3 ( 5,4%)	16 (28,6%)
Sí	80 (76,9%)	49 (87,5%)	29 (51,8%)
Hemodiálisis	76 (95,0%)	46 (93,9%)	28 (96,6%)
DP Continua Ambul.	1 ( 1,3%)	0 ( 0,0%)	1 ( 3,4%)
DP Autom. Nocturna	2 ( 2,5%)	2 ( 4,1%)	0 ( 0,0%)
No consta	1 ( 1,3%)	1 ( 2,0%)	0 ( 0,0%)

*Tabla V. Ha recibido algún tipo de diálisis en estos días de ingreso en el hospital*

En la tabla VI vemos que un 67,3% de los pacientes encuestados conoce que puede elegir la modalidad de diálisis que desea, siendo este porcentaje mayor entre los trasplantados que entre los no programados.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No	34 (32,7%)	27 (48,2%)	6 (13,0%)
Sí	70 (67,3%)	29 (51,8%)	40 (87,0%)

*Tabla V. Sabe si puede elegir la modalidad de diálisis que desea*

La tabla VI muestra el conocimiento sobre la posibilidad de cambiar de modalidad cuando lo deseen de los pacientes encuestados, que muestran bastante desconocimiento de esta situación, especialmente entre los no programados.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	1 ( 1,0%)	0 ( 0,0%)	0 ( 0,0%)
No	43 (41,3%)	32 (57,1%)	10 (21,7%)
Sí	60 (57,7%)	24 (42,9%)	36 (78,3%)

*Tabla VI. Sabe si puede cambiar de modalidad de diálisis cuando lo desee*

En la tabla VII observamos que la mayoría de los pacientes que cree que hay alguna modalidad de diálisis más efectiva / buena que otras se decantan por la HD, tanto en el total como en cada uno de los grupos analizados.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	39 (37,5%)	22 (39,3%)	15 (32,6%)
No	14 (13,5%)	8 (14,3%)	6 (13,0%)
Sí	51 (49,0%)	26 (46,4%)	25 (54,3%)
HD	44 (86,3%)	21 (80,8%)	23 (92,0%)
DPCA	5 ( 9,8%)	4 (15,4%)	1 ( 4,0%)
DPAN	2 ( 3,9%)	1 ( 3,8%)	1 ( 4,0%)

*Tabla VII. Cree que hay alguna modalidad de diálisis que sea más efectiva/buena que otras*

Se observa en la tabla VIII que la mayoría de pacientes habían sido advertidos de que si no comenzaban el tratamiento de diálisis que desearan podrían necesitar diálisis de urgencia y que ponían en riesgo su salud (78 de 96 en los que consta este hecho, es decir, en un 81.3%).

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	8 ( 7,7%)	7 (12,5%)	1 ( 2,2%)
No	18 (17,3%)	12 (21,4%)	5 (10,9%)
Sí	78 (75,0%)	37 (66,1%)	40 (87,0%)

*Tabla VIII. Había sido advertido de que si no comenzaba el tratamiento de diálisis que deseara podría necesitar diálisis de urgencia y que ponía en riesgo su salud*

Vemos que la mayoría de pacientes trasplantados habían estado en la consulta de nefrología antes de ingresar, cosa que no ocurre con los pacientes no programados como se puede observar en la tabla IX.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No	45 (43,3%)	36 (64,3%)	8 (17,4%)
Sí	59 (56,7%)	20 (35,7%)	38 (82,6%)

*Tabla IX. Había estado en la consulta de Nefrología antes de ingresar*

En la tabla X se observa, para aquellos pacientes que habían sido advertidos de que si no comenzaban el tratamiento de diálisis que desearan podrían necesitar diálisis de urgencia y que ponían en riesgo su salud, cuantos habían expresado su voluntad de iniciar un tratamiento de diálisis concreto, y en concreto esto ocurría en 30 pacientes (de 66 en los que se ha recogido esta característica, es decir, en un 45.5%).

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
Habían sido advertidos	78 (75,0%)	37 (66,1%)	40 (87,0%)
Habían expresado su voluntad de iniciar un tratamiento de diálisis concreto			
No consta	12 (15,4%)	11 (29,7%)	1 ( 2,5%)
No	36 (46,2%)	14 (37,8%)	22 (55,0%)
Sí	30 (38,5%)	12 (32,4%)	17 (42,5%)

*Tabla X. Si había sido advertido, había expresado su voluntad de iniciar un tratamiento de diálisis concreto*

De los 30 que habían expresado sido advertidos de que si no comenzaban el tratamiento de diálisis que desearan podrían necesitar diálisis de urgencia y que ponían en riesgo su salud, y que además habían expresado su voluntad de iniciar un tratamiento de diálisis concreto, tenemos que 6 (20,0%) inician la modalidad que eligen, 7 no la inician (23,3%) (debido a las siguientes causas: no ser buen candidato para CAPD ni para HDD, por problemas en el catéter, por urgencia le colocaron un colector, porque al conocerla no le gusto, porque no dio tiempo a colocar el catéter, porque no funcionaba el catéter que se había colocado o porque prefiere la DP pero teme contraindicaciones), mientras que en los 17 restantes (56,7%) no consta.

También se les pregunta si consideran que hay alguna modalidad de diálisis que no esté indicada para ellos, recogiendo la información que se muestra en la tabla XI. En ella podemos ver que, de los 44 pacientes que creen que efectivamente existe alguna modalidad no indicada, la mayoría se decanta por la DPCA.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	6 ( 5,8%)	5 ( 8,9%)	1 ( 2,2%)
No	54 (51,9%)	29 (51,8%)	23 (50,0%)
Sí	44 (42,3%)	22 (39,3%)	22 (47,8%)
La HD	13 (29,5%)	7 (31,8%)	6 (27,3%)
La HD domicilio	16 (36,4%)	7 (31,8%)	9 (40,9%)
La DPCA	23 (52,3%)	12 (54,5%)	11 (50,0%)
La DPAN	14 (31,8%)	9 (40,9%)	5 (22,7%)
Sólo la HD	12 (27,3%)	6 (27,3%)	6 (27,3%)
Ni la HD ni la DPCA ni la DPAN	1 ( 2,3%)	1 ( 4,5%)	0 ( 0,0%)
Ni la HD dom. ni la DPCA ni la DPAN	6 (13,6%)	4 (18,2%)	2 ( 9,1%)
Ni la HD dom. ni la DPCA	2 ( 4,5%)	0 ( 0,0%)	2 ( 9,1%)
Sólo la HD domicilio	8 (18,2%)	3 (13,6%)	5 (22,7%)
Ni la DPCA ni la DPAN	6 (13,6%)	3 (13,6%)	3 (13,6%)
Sólo la DPCA	8 (18,2%)	4 (18,2%)	4 (18,2%)
Sólo la DPAN	1 ( 2,3%)	1 ( 4,5%)	0 ( 0,0%)

*Tabla XI. Considera que hay alguna modalidad de diálisis que no esté indicada para usted*

Respecto a si existe alguna modalidad que crean que tiene un mayor riesgo para la salud de los pacientes encuestados, en la tabla XII vemos que la mayoría que responde afirmativamente se decanta por la DPCA, seguidos de la DPAN y la HD domiciliaria, siendo muy pocos los que señalan la HD como modalidad de riesgo.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	7 ( 6,7%)	6 (10,7%)	1 ( 2,2%)

No	66 (63,5%)	35 (62,5%)	30 (65,2%)
Sí	31 (29,8%)	15 (26,8%)	15 (32,6%)
La HD	5 (16,1%)	1 ( 6,7%)	3 (20,0%)
La HD domicilio	8 (25,8%)	5 (33,3%)	3 (20,0%)
La DPCA	20 (64,5%)	10 (66,7%)	10 (66,7%)
La DPAN	9 (29,0%)	5 (33,3%)	4 (26,7%)
Sólo la HD	5 (16,1%)	1 ( 6,7%)	3 (20,0%)
Sólo la HD domicilio	6 (19,4%)	4 (26,7%)	2 (13,3%)
Ni la HD dom. ni la DPCA ni la DPAN	2 ( 6,5%)	1 ( 6,7%)	1 ( 6,7%)
Ni la DPCA ni la DPAN	7 (22,6%)	4 (26,7%)	3 (20,0%)
Sólo la DPCA	11 (35,5%)	5 (33,3%)	6 (40,0%)

*Tabla XII. Hay alguna modalidad de diálisis que considere que tiene más riesgo para su salud*

La tabla XIII muestra que modalidad les parece más cómoda para desarrollar su modo de vida habitual, y de nuevo se observa una gran mayoría de pacientes que se decantan por la HD.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No consta	9 ( 8,7%)	5 ( 8,9%)	2 ( 4,3%)
HD	77 (74,0%)	41 (73,2%)	36 (78,3%)
HD domicilio	2 ( 1,9%)	0 ( 0,0%)	2 ( 4,3%)
DPCA	4 ( 3,8%)	2 ( 3,6%)	2 ( 4,3%)
DPAN	12 (11,5%)	8 (14,3%)	4 ( 8,7%)

*Tabla XIII. En calidad de vida para desarrollar su modo de vida habitual, que modalidad que le parece más cómoda*

La tabla XIV muestra la información recibida de otros pacientes en diálisis que los pacientes han recibido durante su ingreso o antes de él.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No	21 (20,2%)	14 (25,0%)	6 (13,0%)
Sí	83 (79,8%)	42 (75,0%)	40 (87,0%)
No consta modalidad	3 ( 3,6%)	3 ( 7,1%)	0 ( 0,0%)
En HD	63 (75,9%)	31 (73,8%)	32 (80,0%)
No consta	2 ( 3,2%)	1 ( 3,2%)	1 ( 3,2%)
No me informé	3 ( 4,8%)	2 ( 6,5%)	1 ( 3,2%)
Desfavorable	4 ( 6,3%)	2 ( 6,5%)	2 ( 6,3%)
Favorable	54 (85,7%)	26 (83,9%)	28 (87,5%)
En HD domicilio	3 ( 3,6%)	1 ( 2,4%)	2 ( 5,0%)
No me informé	1 (33,3%)	1 (100,0%)	0 ( 0,0%)
Desfavorable	2 (66,7%)	0 ( 0,0%)	2 (100,0%)
En DPCA	32 (38,6%)	11 (26,2%)	21 (52,5%)
No consta	1 ( 3,1%)	0 ( 0,0%)	1 ( 4,8%)
No me informé	3 ( 9,4%)	0 ( 0,0%)	3 (14,3%)
Desfavorable	12 (37,5%)	3 (27,3%)	9 (42,9%)
Favorable	16 (50,0%)	8 (72,7%)	8 (38,1%)
En DPAN	21 (25,3%)	9 (21,4%)	11 (27,5%)
No consta	1 ( 4,8%)	1 (11,1%)	0 ( 0,0%)
Desfavorable	3 (14,3%)	0 ( 0,0%)	3 (27,3%)

Favorable	17 (81,0%)	8 (88,9%)	8 (72,7%)
En HD, HD dom., DPCA y DPAN	2 ( 2,4%)	0 ( 0,0%)	2 ( 5,0%)
En HD, DPCA y DPAN	8 ( 9,6%)	4 ( 9,5%)	4 (10,0%)
En HD y DPCA	10 (12,0%)	2 ( 4,8%)	8 (20,0%)
En HD y DPAN	5 ( 6,0%)	2 ( 4,8%)	3 ( 7,5%)
Sólo en HD	38 (45,8%)	23 (54,8%)	15 (37,5%)
Sólo en HD dom.	1 ( 1,2%)	1 ( 2,4%)	0 ( 0,0%)
En DPCA y DPAN	2 ( 2,4%)	1 ( 2,4%)	1 ( 2,5%)
Sólo en DPCA	10 (12,0%)	4 ( 9,5%)	6 (15,0%)
Sólo en DPAN	4 ( 4,8%)	2 ( 4,8%)	1 ( 2,5%)

*Tabla XIV. Durante el ingreso o antes de él, si ha conocido pacientes en alguna modalidad de diálisis y cómo fue la información que recibió*

La tabla XV muestra el conocimiento que de asociaciones renales tienen estos pacientes, y que como vemos es muy alto en el grupo de trasplantados y menor en el de no programados. Entre las diferentes asociaciones, ALCER es la que más se conoce.

	Total	No programados	Trasplantados
Total	104 (100,0%)	56 (100,0%)	46 (100,0%)
No	36 (34,6%)	30 (53,6%)	5 (10,9%)
Sí	68 (65,4%)	26 (46,4%)	41 (89,1%)
No consta	4 ( 5,9%)	3 (11,5%)	1 ( 2,4%)
Sólo ALCER	42 (61,8%)	15 (57,7%)	27 (65,9%)
Sólo ADER	7 (10,3%)	4 (15,4%)	3 ( 7,3%)
ALCER y ADER	11 (16,2%)	2 ( 7,7%)	9 (22,0%)
Sólo ERTE	4 ( 5,9%)	2 ( 7,7%)	1 ( 2,4%)
Conoce ALCER	53 (77,9%)	17 (65,4%)	36 (87,8%)
Conoce ADER	18 (26,5%)	6 (23,1%)	12 (29,3%)
Conoce ERTE	4 ( 5,9%)	2 ( 7,7%)	1 ( 2,4%)

*Tabla XV. Conoce usted alguna asociación de pacientes renales*

La tabla XVI muestra, para los que conocen ALCER, si saben si pueden obtener información de todo lo relacionado con su enfermedad en dicha asociación. Se observa que la mayoría afirma que lo sabe.

	Total	No programados	Trasplantados
Conoce ALCER	53 (100,0%)	17 (100,0%)	36 (100,0%)
No consta	1 ( 1,9%)	0 ( 0,0%)	1 ( 2,8%)
No sabe que puede obtenerla	2 ( 3,8%)	1 ( 5,9%)	1 ( 2,8%)
Sabe que puede obtenerla	50 (94,3%)	16 (94,1%)	34 (94,4%)

*Tabla XVI. Si se ha nombrado ALCER, ¿sabe que puede obtener información de todo lo relacionado con su enfermedad en Alcer?*

En la tabla XVII tenemos, para los que conocen ALCER, si saben donde dirigirse para contactar con dicha asociación, y vemos que la mayoría afirma que lo sabe.

	Total	No programados	Trasplantados
Conoce ALCER	53 (100,0%)	17 (100,0%)	36 (100,0%)
No consta	1 ( 1,9%)	0 ( 0,0%)	1 ( 2,8%)
No sabe donde dirigirse	4 ( 7,5%)	1 ( 5,9%)	3 ( 8,3%)
Sabe donde dirigirse	48 (90,6%)	16 (94,1%)	32 (88,9%)

*Tabla XVII. ¿Conoce donde dirigirse para contactar con Alcer?*